

Cabinet dentaire du Dr Stéphane CANGEMI

Chirurgien-dentiste, D.U. d'Orthodontie, La Destrousse (entre Aix et Aubagne)

Centre médical - route de Peypin D7 - 13112 La Destrousse - Tél. : 04 42 72 26 68 - Fax : 04 42 72 26 68

<http://dr-cangemi-stephane.chirurgiens-dentistes.fr>

À L'ATTENTION PERSONNELLE DE _____

FICHE CONSEIL N° **2.05**

Rubrique : Les enfants et les adolescents

Impact de la succion du pouce sur l'ensemble bucco-dentaire

Une succion du pouce prolongée peut avoir un certain nombre de conséquences sur le développement de la mâchoire et des dents, ainsi que sur des fonctions telles que la déglutition, l'élocution...

Le réflexe de succion est physiologique et déjà présent avant la naissance, il est indispensable pour le développement du petit enfant.

Mais la succion dans la durée du pouce, de la tétine ou l'utilisation prolongée du biberon, font mauvais ménage avec une bonne évolution dentaire.

La succion persistante fait perdurer ce que l'on appelle une déglutition infantile : la langue adopte une position incorrecte, trop basse, au repos comme lors de la déglutition de la salive (2000 fois par jour en moyenne). Elle s'interpose en avant entre les dents du haut et celles du bas ou vient pousser sur les incisives au lieu de monter s'appuyer au palais et exercer une pression latérale qui contribue au bon développement transversal des mâchoires.

La mandibule (mâchoire inférieure) est alors sous-développée de même que le maxillaire supérieur. Les dents du haut peuvent se trouver projetées en avant et la lèvre inférieure tend à se positionner entre les deux arcades dentaires donnant à l'enfant une physionomie particulière (dents de lapin).

On le voit, la succion intense mène à un déséquilibre des forces musculaires.

Or c'est l'équilibre des forces musculaires de la zone orale (lèvres et langue, qui permet l'évolution équilibrée des maxillaires et un bon positionnement des dents.



Succion du pouce et orthodontie

Visuels de droite : enfant de 10 ans présentant une béance des incisives.

Traitement par arrêt du pouce et rééducation linguale. Port d'un appareil Quad Helix

Il est conseillé d'effectuer une première consultation orthodontique avant l'âge de 6 ans, même si votre enfant a abandonné son pouce rapidement.

Si votre enfant a sucé son pouce tardivement, ou s'il le suce encore, nous pourrions intervenir pour l'aider à quitter cette habitude et voir si un traitement orthodontique est nécessaire.

En effet les traitements orthodontiques sont pratiqués maintenant plus tôt, avec des appareils spécifiques, simples et sur des durées courtes. Cela permet souvent d'éviter des soins plus lourds à l'adolescence.

Bien sûr tous les enfants ne nécessitent pas d'intervention précoce.

La succion du pouce n'est pas une contre-indication à une prise en charge orthodontique. Au contraire, cela peut faciliter la période de sevrage.

N'hésitez pas à nous en parler afin de déterminer si le traitement doit être poursuivi ou suspendu.

A lire aussi : [La succion du pouce : faut-il intervenir ?](#)



Nos conseils

- Les enfants qui sucent leur pouce n'ont pas tous, obligatoirement, des problèmes orthodontiques. Il y a souvent un ensemble de facteurs qui coexistent (durée de la succion, tonicité musculaire).
- Si l'enfant continue à sucer son pouce avec son appareil ou l'enlève pour sucer, n'hésitez pas à demander un avis pour savoir si le traitement doit être maintenu.